DISFRUTE DE LA VIDA SIN PROBLEMAS URINARIOS

Bioginefarma

HYACYST®

(Hialuronato de sodio) 120 mg / 50 ml y
40mg / 50ml
Jeringas precargadas listas para usar

Hialuronato de sodio
Tratamiento de primera línea para la sustitución de GAG

FP10
Aprobdo

APROBADO Y
COMERCIALIZADO
EN EL REINO UNIDO
Y PAÍSES EUROPEOS

Hyacyst® PFS la gama ideal para la auto-instilación a domicilio

Hyacyst® PFS - Efecto comprobado en el tratamiento de cistitis intersticial y cistitis bacteriana recurrente

Biogínefarma

HYACYST®

Hyacyst® está indicado para el llenado temporal de la capa GAG en las siguientes situaciones de vejiga:

Síndrome de vejiga dolorosa / cistitis intersticial (CI), Cistitis bacteriana recurrente, cistitis inducida por radiación, cistitis hemorrágica y cistitis inducida por quimioterapia.[5]

- **Hyacyst® PFS Gama ideal para auto-instilación en el domicilio.**
- **Hyacyst® 120 PFS es tan eficaz como el tratamiento combinado de restauración de la capa GAG (iAluRil®).**
- **Hyacyst® 120 PFS - Efecto probado en el tratamiento de la cistitis intersticial y la cistitis bacteriana recurrente.**

REFERENCIAS: 1.Gulpinar O et al. Clinical comparison of intravesical hyaluronic acid and hyaluronic acid-chondroitin sulphate therapy for patients with bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Can Ural Assoc J 2014;8(9-10):e610-4›
2. Willard K, A Patient Centred Approach in the Management of Painful Bladder Syndrome, poster P27 at UKCS 2017
3.Drug tariff NHS UK June 2016
4. McCracken P et al., Developing a New Patient Care Pathway for Painful Bladder Syndrome -One year on we evaluate the effectiveness of this service, poster at BAUN 2013
5. **Hyacyst®** Instructions For Use, Date of Revision: March 2016

HYACYST® INFORMACIÓN BREVE DE PRESCRIPCIÓN

Consulte el prospecto e Ingredientes activos (cantidades, cualitativo). Cada jeringa precargada contiene una solución estéril de hialuronato de sodio altamente purificado (120 mg / 50 ml y/o 40 mg / 50ml) de origen no animal. Presentación: Solución transparente para instilación vesical. Indicación: reconstitución de la deficiencia de glicosaminoglicanos (GAG) en la vejiga. La capa de GAG recubre el epitelio de la vejiga. Actúa como una barrera protectora, protegiendo la pared de la vejiga contra microorganismos, toxinas y componentes de la orina que pueden afectar la vejiga. La deficiencia o daño de esta capa da como resultado un aumento de la permeabilidad de la pared de la vejiga y es una explicación importante de la etiología de la cistitis intersticial y el síndrome de vejiga dolorosa. Posología y forma de administración: instilación semanal de 40 mg / 120 mg de Hyacyst durante 4-6 semanas, seguida de una instilación mensual hasta que los síntomas desaparezcan.
Contraindicaciones: hipersensibilidad al hialuronato de sodio. Categoría legal: producto sanitario de clase IIa, CE 2292.
Fecha de preparación: mayo de 2017

Dispositivo medical de clase IIa CE 2292

Biogínefarma

Producto	Descripción	Referencia	Acondicionamiento unidades / Caja
DEXELL® VUR	Implante inyectable Hialuronato de sodio reticulado DEAE 15 mg, Sephadex Dextranomer 50 mg Agua 1ml	DXL-5010	Jeringa de 1x1.0 ml
DEXELL® *SUI*	Implante inyectable Hialuronato de sodio reticulado DEAE 15 mg, Sephadex Dextranómero 50 mg, agua c.s.p 1 ml	DXS-5040	Jeringa de 4x1.0 ml
HYACYST® 120mg/50 ml	Hialuronato de Sodio 120 mg / 50ml	HYC 1250S	Jeringa precargada lista para usar
HYACYST® 40mg/50 ml	Hialuronado de Sodio 40 mg / 50 ml	HYC – 4050S	Jeringa precargada lista para usar
Aguja metálica ELITESHARP	Aguja para la inyección de carga en el tratamiento de enfermedad uretral	19 G / 35 cm	



Catálogo destinado a profesional sanitario.

Bioginefarma S.L.U.
Calle Germán Bernacer, Nº17, parque empresarial de Elche, 03203, Elche (Alicante)
contact@bioginefarma.com
965500375
www.bioginefarma.com